

Aplicación del lavado con heparina (técnica Roviralta) en hematoma en pierna por acenocumarol con reparación con injerto libre.

J. Moreno, A. Roig, J.M. Serra, T. Bertomeu, O. Salvado, A. Piñol, G. Yupanqui, J.L. Grasa, X. Mora, Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Tortosa,

•**Introducción:** Los hematomas por anticoagulantes son frecuentes, constituyendo una importante complicación en pacientes frágiles, que requieren complejas y complicadas curas, muchas veces durante largos periodos de tiempo. La técnica de desbridamiento y lavado del coágulo con heparina tópica, descrita por S Roviralta, ha demostrado su eficacia para reducir tanto la agresividad de las curas como la duración del tratamiento.

Caso Clínico: Mujer de 77años con ACxFA crónica en tto con digoxina y acenocumarol que ingresa por hematoma de 20x8cm en pierna dcha por anticoagulación, con compromiso cutáneo. Se realiza desbridamiento quirúrgico con retirada de la piel isquémica y limpieza del hematoma.



Posteriormente curas con heparina tópica (técnica Roviralta) con gran mejoría a los 5 días, obteniendo tejido de granulación limpio, seguido de con hidrofibra e hidrogel durante 15 días para granulación.

Al cabo de 20 días se realiza injerto cutáneo libre de muslo homolateral, con gran resultado que es altado con curas secas con povidona al cabo de una semana.



Conclusion: Los hematomas a tensión en EEII por anticoagulantes pueden ser la causa de heridas de gran tamaño que requieren de curas especializadas pero la técnica Roviralta de limpieza quirúrgica + curas con heparina tópica puede reducir los gastos y la estancia en estos pacientes.